

## CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES PRISES EN CHARGE DANS LES CSAPA EN 2020

### RÉSUMÉ

En 2020, 267 CSAPA ont participé au dispositif RECAP, sur un nombre total d'environ 500 CSAPA en comptant leurs différentes antennes, en fournissant des données sur plus de 203 000 patients, dont 73 000 patients vus pour la première fois en CSAPA en 2020. L'âge médian des patients est de 40 ans, et trois quarts d'entre eux sont des hommes. Plus de la moitié des patients vus en 2020 consultent en raison de leur consommation d'alcool et/ou de tabac (soit environ 86 000), 17 % pour leur consommation de cannabis (près de 28 000) et 28 % pour des substances illicites autres que le cannabis (soit 46 000 patients). Parmi ces derniers, 41 % prennent de l'héroïne et 29 % de la cocaïne.

Le nombre total de patients accueillis en CSAPA en 2020 a diminué par rapport à 2019, effet probable de la crise sanitaire qui a vu de nombreux services fermer momentanément durant la première période de confinement, puis restreindre l'accueil collectif des patients. Cette baisse concerne en majorité les usagers de drogues illicites (hors cannabis) qui, en 2020, ne représentent que 18 % des nouveaux patients pris en charge, alors que ces patients concernaient 26 % de l'ensemble de la file active observée en 2019.

### SOMMAIRE

<b>Profil des personnes accueillies</b>	<b>2</b>	<b>Personnes prises en charge pour un problème d'addictions sans substance</b>	<b>10</b>
<b>Patients pris en charge pour usage de cannabis</b>	<b>4</b>	<b>Ensemble des patients pris en charge en CSAPA</b>	<b>14</b>
<b>Patients pris en charge pour usages d'autres substances illicites</b>	<b>6</b>		
<b>Patients pris en charge pour usages d'alcool ou de tabac</b>	<b>9</b>		

Ce bilan de l'enquête recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP) fait le point sur les principales évolutions récentes des caractéristiques des personnes ayant un problème de conduite addictive accompagnées et prises en charge par les équipes des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). En 2020, 267 CSAPA ont été en mesure de transmettre leurs données dans les délais impartis. Les données RECAP contribuent à l'indicateur TDI (*treatment demand indicator* : indicateur sur les demandes de traitement) que l'OFDT renseigne chaque année pour l'Agence européenne des drogues (EMCDDA).

## PROFILS DES PERSONNES ACCUEILLIES


Parmi l'ensemble des personnes prises en charge et pour lesquelles une consommation de produits ou une addiction sans substance ont été renseignées, il est possible de distinguer quatre types de patients : les personnes prises en charge principalement pour leur consommation

- de cannabis ;
- d'alcool ou de tabac ;
- de substances illicites autres que le cannabis, très majoritairement d'usagers d'opioïdes et/ou de cocaïne (ce groupe de patients sera dénommé par la suite « usagers d'autres substances illicites ») ;
- les personnes consultant pour un problème d'addictions sans substance<sup>1</sup> (tableau 1).

Par ailleurs, il convient de noter que 73 187 personnes ont été vues pour la première fois en 2020 (tableau 2), contre 54 093 en 2019. Ce groupe de nouveaux patients<sup>2</sup> fera l'objet d'une exploitation spécifique en comparaison avec la file active 2019.

En 2020, parmi le public des CSAPA dont les données RECAP ont pu être exploitées, une personne sur deux est prise en charge en raison de sa consommation d'alcool ou de tabac, plus d'une sur quatre pour sa consommation d'autres substances illicites, et moins d'une sur cinq en raison de sa consommation de cannabis (graphique 1). Enfin, une petite minorité (moins de 4 %) est accueillie en raison de problèmes d'addictions comportementales essentiellement aux jeux d'argent et de « cyberaddiction ».

**Graphique 1. Répartition des personnes incluses dans RECAP suivant les groupes en 2019 et 2020**



Source : RECAP, OFDT

Par rapport à 2019, on n'observe pas d'évolution notable quant à cette répartition : dans le prolongement de la tendance observée en 2019, la part des effectifs d'usagers d'autres substances illicites progresse très légèrement tandis que celle du groupe d'usagers de cannabis diminue. L'effectif du groupe addictions sans substance n'a pas poursuivi la progression observée entre 2018 et 2019 et est resté stable entre 2019 et 2020.

1. L'inclusion dans ces groupes tient compte du produit indiqué comme posant le plus de problèmes (produit cité en premier), du produit à l'origine de la prise en charge et de la présence d'un traitement de substitution aux opioïdes. Pour plus de précision sur ces critères de répartition, on se référera au document « Données 2019 : tableaux statistiques » au format PDF ou Excel <https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/recap/>

2. Le terme « nouveaux patients » désigne les patients dont la première consultation dans leur CSAPA a eu lieu lors de l'année 2020

**Tableau 1. Effectifs des personnes incluses dans RECAP suivant les groupes en 2019 et 2020**

	File active 2020		File active 2019	
	N	%	N	%
Groupe cannabis	28 058	16,8	34 667	19,0
Groupe autres substances illicites	46 291	27,8	47 640	26,1
Groupe alcool, tabac	86 087	51,6	93 221	51,1
Groupe addictions sans substances	6 247	3,7	7 057	3,9
Total avec information sur les produits (1+2+3+4)	166 683	100,0	182 585	100,0
Total sans informations sur les produits	36 395	17,9	33 257	15,4
Total général	203 078	100,0	216 235	100,0

Source : RECAP, OFDT

**Tableau 2. Nouveaux patients 2020**

	Nouveaux patients 2020	
	N	%
Groupe cannabis	14 314	22,2
Groupe autres substances illicites	11 448	17,8
Groupe alcool, tabac	35 358	54,9
Groupe addictions sans substances	3 331	5,2
Total avec information sur les produits (1+2+3+4)	64 451	100,0
Total sans informations sur les produits	8 736	11,9
Total général	73 187	100

Source : RECAP, OFDT

La répartition des nouveaux patients (patients entrés en contact pour la première fois en 2020 avec un CSAPA) selon ces quatre profils est un peu différente de celle de l'ensemble de la file active. Les parts des groupes alcool et addictions sans substance sont légèrement supérieures mais, surtout, la part du groupe cannabis est bien supérieure (une personne sur cinq contre une sur six) et celle du groupe autres substances illicites très inférieure (une personne sur six contre plus d'une sur quatre). Cette différence s'explique par des durées de suivi beaucoup plus longues pour ces usagers comparativement à ceux de cannabis.

La différence majeure entre le public de 2019 et les nouveaux usagers en 2020 est la part bien plus faible du groupe usagers d'autres substances illicites pour les nouveaux patients. Cette baisse est principalement compensée par la hausse des parts des groupes cannabis et alcool, tabac.

## Nouveaux patients

Les données sur les nouveaux patients présentent l'avantage de refléter leur situation récente, puisque c'est celle qui prévaut au moment de leur entrée en contact avec le centre au cours de l'année sur laquelle porte le bilan. Ce n'est pas forcément le cas pour les patients suivis d'une année sur l'autre, les dossiers n'étant pas toujours mis à jour. Les informations concernant, par exemple, les produits consommés peuvent avoir été enregistrées plusieurs années auparavant et ne pas avoir été modifiées depuis. Ce phénomène reste cependant limité par le renouvellement d'une part importante de la file active des patients au bout de quelques années. L'observation des évolutions d'une année sur l'autre est néanmoins en partie brouillée par la persistance dans les dossiers de données non mises à jour. Les chiffres sur les nouveaux patients permettent donc une description plus précise des évolutions. Ces patients présentent cependant des caractéristiques spécifiques et ne peuvent être considérés comme pleinement représentatifs de l'ensemble des patients pris en charge dans les CSAPA. L'observation doit combiner ces différentes approches en tenant compte autant que possible de l'imperfection de ces éléments de quantification.

# PATIENTS PRIS EN CHARGE POUR USAGE DE CANNABIS


## Nouveaux patients du groupe cannabis

Le nombre de nouveaux patients en 2020 inclus dans le groupe cannabis est de plus de 14 000, soit 22 % de la totalité des nouveaux patients et près de 50 % de la file active du groupe cannabis.

### Évolutions principales entre la file active 2019 et les nouveaux patients 2020

Chez les nouveaux patients, la part des hommes a légèrement diminué par rapport à celle de la file active totale du groupe cannabis en 2019.


Graphique 2. Répartition des patients par sexe en 2019 et 2020



Source : RECAP, OFDT

On observe également un rajeunissement de la population des nouveaux patients par rapport à l'ancienne file active. L'âge médian diminue d'un an, il passe de 25 à 24 ans.


Graphique 3. Répartition des patients par tranche d'âge en 2019 et 2020



Source : RECAP, OFDT

Parmi les origines possibles de la prise en charge, on observe une nette diminution des obligations de soins, compensée par une hausse des autres catégories et notamment de l'initiative du patient et du classement avec orientation.

**Graphique 4. Répartition des patients selon l'origine de leur prise en charge en 2019 et 2020**



Source : RECAP, OFDT

## File active totale du groupe cannabis

Le nombre de personnes prises en charge pour usage de cannabis en 2020 est de plus de 28 000, soit presque 18 % de la file active totale de RECAP en 2020.

### Profils

Ces patients sont à 85 % des hommes, et leur âge médian est de 26 ans.

Les trois quarts des patients n'ont pas d'enfants. Plus de 80 % ont un logement durable, soit en indépendance ou bien chez des proches. Environ 87 % ont un niveau d'étude inférieur ou égal au baccalauréat.

Parmi les fumeurs quotidiens de cannabis, qui représentent plus de 70 % des patients du groupe, le nombre médian de joints par jour est de 4. Plus de la moitié du groupe a commencé à consommer du cannabis il y a dix ans ou plus.

Plus de 60 % de ces patients consomment plusieurs produits. Dans les produits consommés autres que le cannabis, on retrouve principalement le tabac, pour 43 % des patients, et l'alcool pour 28 % d'entre eux. 7 % des patients présentent une consommation de cocaïne. Parmi les fumeurs quotidiens de tabac, le nombre médian de cigarettes par jour est de 10, soit 5 de moins que la médiane pour l'ensemble de la file active RECAP 2020.

Environ 10 % des patients pris en charge pour leur consommation de cannabis ont déjà été incarcérés au moins une fois au cours de leur vie.

# PATIENTS PRIS EN CHARGE POUR USAGES D'AUTRES SUBSTANCES ILLICITES

## Nouveaux patients du groupe autres substances illicites

Le nombre de nouveaux patients en 2020 inclus dans le groupe autres substances illicites est de plus de 11 000, soit 18 % de la totalité des nouveaux patients et près de 30 % de la file active du groupe autres substances (voir tableau 3 pour le détail des différents produits).

**Tableau 3. Répartition des patients du groupe autres substances illicites suivant les produits consommés, en 2019 et 2020.**

	Nouveaux patients 2020	File active 2019
	%	%
Alcool	39,1	35,3
Tabac	31,7	34,7
Cannabis	29,8	39,0
Benzodiazépines	6,8	7,2
Autres hypnotiques et tranquillisants	2,1	1,6
Antidépresseurs	0,7	0,6
Barbituriques	0,3	0,4
GHB/GBL	0,9	0,5
Héroïne	30,2	46,2
Autres opiacés	9,3	8,0
Buprénorphine haut dosage	5,7	8,4
Méthadone	6,1	8,4
Fentanyl	0,3	0,4
Cocaïne*	32,7	32,2
Crack**	6,7	7,0
Autres dérivés cocaïne	0,1	0,2
MDMA et dérivés	3,4	2,7
Amphétamines	1,9	1,8
Méthamphétamines	0,5	0,5
Cathinones synthétiques	1,9	0,7
Autres stimulants	0,8	0,6
LSD	1,3	1,4
Champignons	0,2	0,3
Kétamine	1,6	0,7
Autres hallucinogènes	0,3	0,3
Colles et solvants	0,2	0,7
Autres produits	3,8	2,8
Jeux d'argent	0,4	0,3
Cyberaddiction	0,2	0,2
Trouble léger du comportement alimentaire	0,4	0,3
Autre addiction sans produit	0,2	0,2

Source : RECAP, OFDT


\* Cocaïne poudre \*\* Crack et cocaïne basée

## Évolutions principales entre la file active 2019 et les nouveaux patients 2020


Chez les nouveaux patients, la part des hommes a diminué par rapport à celle de la file active totale du groupe autres substances illicites en 2019.

Graphique 5. Répartition des patients par sexe en 2019 et 2020

Répartition des patients en 2019



Répartition des nouveaux patients en 2020




Femmes  
Hommes

Source : RECAP, OFDT

On observe également un rajeunissement de la population des nouveaux patients par rapport à l'ancienne file active. L'âge médian diminue de trois ans, il passe de 39 à 36 ans. L'effectif des plus de 30 ans diminue fortement, contrairement à celui des moins de 30 ans qui augmente. La part des patients consommant de l'alcool est en légère hausse, mais elle diminue légèrement pour le tabac. La part des patients qui consomment du cannabis ou qui consomment de l'héroïne a fortement diminué.


Graphique 6. Répartition des patients par tranche d'âge en 2019 et 2020



Source : RECAP, OFDT



Graphique 7. Part des patients consommant le produit, par produit en 2019 et 2020



Source : RECAP, OFDT

## File active totale du groupe autres substances illicites

Le nombre total de personnes prises en charge pour usages d'autres substances illicites en 2020 est de plus de 46 000, soit presque 28 % de la file active totale des CSAPA en 2020.

### Profils

L'âge médian y est de 40 ans, et 85 % des patients ont plus de 30 ans. Près de 47 % des patients de ce groupe ont au moins un enfant.

Près de 60 % des patients ont un logement en indépendance, et plus de 30 % des patients ont une activité rémunérée continue. Plus de 55 % des patients ont été à l'initiative de leur propre prise en charge.

Le produit le plus consommé dans ce groupe est l'héroïne, consommée par 41 % des patients. Les autres produits sont l'alcool (40 %), le cannabis (36 %), le tabac (35 %) et la cocaïne (29 %).

Parmi les patients pour qui le produit posant le plus de problèmes est l'héroïne (14 000 patients) ou la cocaïne (5 500 patients), respectivement 57 % et 34 % des patients en ont un usage quotidien. Presque 30 % de la file active du groupe a déjà consommé un ou des produit(s) par voie intraveineuse, et l'âge médian de la première injection est de 20 ans. Parmi les patients qui utilisent la voie intraveineuse, presque 17 % ont déjà partagé une ou des seringues(s).

Plus de 63 % des patients suivent un traitement de substitution aux opioïdes, principalement à base de méthadone (41 %) ou Subutex® (22 %).

La sérologie VIH est positive pour 4 % des patients, et 21 % des patients ont une sérologie VHC positive.

Près de 28 % des patients ont des antécédents d'hospitalisation pour raison psychiatrique.




# PATIENTS PRIS EN CHARGE POUR USAGES D'ALCOOL OU DE TABAC

## Nouveaux patients du groupe alcool, tabac


Le nombre de nouveaux patients en 2020 inclus dans le groupe alcool, tabac est de plus de 14 000, soit 22 % de la totalité des nouveaux patients et près de 50 % de la file active du groupe.

Graphique 8. Répartition des patients par tranche d'âge en 2019 et 2020



Source : RECAP, OFDT

Graphique 9. Répartition des patients selon leur situation socio-professionnelle en 2019 et 2020



Source : RECAP, OFDT

## Évolutions principales entre la file active 2019 et les nouveaux patients 2020

On observe un important rajeunissement de la population des nouveaux patients par rapport à l'ancienne file active. La proportion de patients de plus de 30 ans diminue de presque 7 %. L'âge médian diminue de trois ans, il passe de 45 à 42 ans.

La part des patients ayant une activité rémunérée continue (voir graphique 8, p. 9) est supérieure de 5 %, et atteint plus de 47%. La part des patients inactifs est bien inférieure, à un peu moins de 12 %. La part des patients ayant une activité intermittente diminue et passe en deçà de 7 %.

La hausse de la part des étudiants couplée à la baisse de la part des retraités s'explique par le rajeunissement de la population évoqué précédemment.

## File active totale du groupe alcool, tabac

Le nombre de personnes prises en charge pour usages d'alcool ou de tabac en 2020 est de plus de 86 000, soit plus de 50 % de la file active totale de RECAP en 2020.

### Profils

L'âge médian de ces patients est de 45 ans, et plus de 87 % d'entre eux ont plus de 30 ans. Plus de 60 % des patients ont au moins un enfant.

Quant au logement, presque 74 % des patients ont un logement durable en indépendance, et plus de 10 % un logement durable chez des proches. L'origine des ressources de plus de la moitié des patients correspond à des revenus d'emploi, et plus de 42 % des patients ont une activité rémunérée continue.

Plus de 42 % des patients ne consomment qu'un seul produit, et près de 40 % en consomment deux. Les trois principaux produits consommés sont l'alcool (89 % des patients), le tabac (55 % des patients) et le cannabis (21 % des patients).

Parmi les patients pour lesquels l'alcool est le produit posant le plus de problèmes (69 000 patients), la moitié en consomment quotidiennement, et depuis plus de 25 ans.

Au sein de la file active totale du groupe alcool, tabac, près de 20 % des patients ont déjà été hospitalisés pour raison psychiatrique.

## PERSONNES PRISES EN CHARGE POUR UN PROBLÈME D'ADDICTIONS SANS SUBSTANCE


### Nouveaux patients du groupe addictions sans substance

Le nombre de nouveaux patients en 2020 inclus dans le groupe addictions sans substance est de plus de 3 300, soit 5 % de la totalité des nouveaux patients et plus de 55 % de la file active du groupe.

### Évolutions principales entre la file active 2019 et les nouveaux patients 2020

Chez les nouveaux patients, la part des femmes a diminué par rapport à celle de la file active totale du groupe addictions sans substance en 2019.


**Graphique 10. Répartition des patients par sexe en 2019 et 2020**



Source : RECAP, OFDT

On observe également un rajeunissement de la population des nouveaux patients par rapport à l'ancienne file active. L'âge médian diminue d'un an, il passe de 32 à 28 ans. La part des plus de 40 ans passe de 36% à 28%.


**Graphique 11. Répartition des patients par tranche d'âge en 2019 et 2020**



Source : RECAP, OFDT

La proportion de patients vivant seuls baisse de 4 points, elle passe de 24 % à 20 %, tandis que celle des patients vivant avec leurs parents augmente de 2,5 % pour passer de 37 % à plus de 39 %.

Graphique 12. Répartition des patients selon l'entourage en 2019 et 2020




Source : RECAP, OFDT

La part des patients étudiants, élèves ou en stage non rémunéré passe de 30 % à 34 %, soit une augmentation de plus de 4 points. En parallèle, les parts des retraités et des autres inactifs diminuent respectivement de 1,6 % et 2,5 %.

Ces résultats sont en accord avec le rajeunissement de la population de ce groupe constaté plus haut.


Graphique 13. Répartition des patients selon leur situation socio-professionnelle en 2019 et 2020



Source : RECAP, OFDT

On observe une baisse de 3,4 points de la part des patients à l'origine de leur propre prise en charge, en parallèle d'une hausse de 4 points pour ceux dont l'origine de la prise en charge est leurs proches.


**Graphique 14. Répartition des patients selon l'origine de la prise en charge en 2019 et 2020**



Source : RECAP, OFDT

On observe une hausse de la part des patients usagers de jeux d'argent de 1 point, et une baisse de 2,2 points de la part des patients souffrant de troubles légers du comportement alimentaire.

**Graphique 15. Répartition des patients selon les produits consommés/la nature de l'addiction en 2019 et 2020**



Source : RECAP, OFDT

## File active totale du groupe addictions sans substance

### Profils

Parmi les patients pris en charge pour une addiction sans substance, plus de 32 % sont des femmes, et 33 % des patients ont moins de 24 ans. L'âge médian est de 33 ans.

Plus du tiers des patients vivent avec leurs parents. La part des étudiants parmi les patients est de plus de 27 %, et celle des patients ayant une activité rémunérée continue est de 38 %. Plus de 53 % des patients ont un niveau d'études supérieures ou équivalent au baccalauréat.

Pour près de 20 % des patients, la prise en charge est à l'initiative des proches du patient.

Plus de 33 % des patients jouent à des jeux d'argent, près de 22 % souffrent d'un trouble léger du comportement alimentaire et 28 % sont sujets à une cyberaddiction.

## ENSEMBLE DES PATIENTS PRIS EN CHARGE EN CSAPA


### Nouveaux patients en CSAPA

Le nombre de nouveaux patients pris en charge en CSAPA en 2020 est de plus de 73 000, soit près de 38 % de l'ensemble des patients pris en charge en CSAPA en 2020.

### Évolutions principales entre la file active 2019 et les nouveaux patients 2020

On observe, globalement, un rajeunissement de la population des nouveaux patients par rapport à l'ancienne file active. La proportion de patients de moins de 25 ans augmente de presque 7 %. L'âge médian diminue de trois ans, passant de 39 à 36 ans.


Graphique 16. Répartition des patients par tranche d'âge en 2019 et 2020



Source : RECAP, OFDT

La proportion de patients ayant une activité rémunérée continue atteint presque 40 % chez les nouveaux patients, et la part des inactifs descend à 14,5 %. La part des étudiants augmente de 2,5 % pour atteindre 11 %, du fait du rajeunissement de la population des nouveaux patients.


**Graphique 17. Répartition des patients selon leur situation socio-professionnelle en 2019 et 2020**



Source : RECAP, OFDT

La proportion de patients consommant de l'alcool a légèrement augmenté, mais celle des patients consommant du tabac et du cannabis a diminué. La proportion de patients consommant de l'héroïne a fortement diminué, pour atteindre près de 7 % de même que celles des « autres opiacés ». Notons que les prises en charge pour des difficultés liées aux pratiques de jeux d'argent et la cyberaddiction ont légèrement augmenté.

**Graphique 18. Répartition des patients selon les produits consommés en 2019 et 2020**



Source : RECAP, OFDT



## File active totale des patients en CSAPA

Le nombre total de personnes prises en charge en CSAPA en 2020 est de plus de 203 000.

### Profils

Plus des trois quarts des patients sont des hommes (77 %), et l'âge médian des patients est de 40 ans.

La moitié des patients a au moins un enfant, et 35 % des patients vivent seuls. Plus de 80 % des patients ont un logement durable. 43 % des patients touchent des revenus d'emploi et 36 % ont une activité rémunérée continue. 20 % des patients ont un niveau supérieur au baccalauréat, et 60 % inférieur à celui-ci.

Les origines principales des prises en charge sont l'initiative du patient (45 %) et les obligations de soins (14 %).

60 % des patients RECAP ont consommé plusieurs produits différents au cours du mois passé.

Les produits les plus consommés sont l'alcool (63 % des patients), le tabac (46 % des patients), le cannabis (38 % des patients), la cocaïne poudre (21 % des patients) et l'héroïne (13 % des patients).

Les fumeurs quotidiens de tabac, au nombre de 69 000, ont une médiane de consommation de cigarettes de 15 par jour. Les fumeurs quotidiens de cannabis, au nombre de 20 000, ont une médiane de consommation de joints de 3 par jour.

### Méthode

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) sont des structures pluridisciplinaires médicosociales qui ont pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux personnes atteintes d'addiction.

Pour l'année 2020, 267 CSAPA ont transmis à l'OFDT des données RECAP exploitables, sur un nombre total d'environ 500 CSAPA en comptant leurs différentes antennes.

Au total, les données d'un peu plus de 203 000 personnes ayant un problème d'addiction ont été incluses dans la base de données RECAP 2020, un peu moins qu'en 2019 (plus de 216 000) malgré une hausse du nombre de CSAPA présents dans la base (260 en 2019).

La proportion de personnes pour lesquelles aucune information sur les produits n'est renseignée a augmenté de 2,5 % depuis 2019 pour atteindre 18 % en 2020.

Les données transmises concernent l'ensemble des patients vus en 2020 :

- profil des patients (sexe, âge) ;
- domicile des patients, type de logement, origine principale des ressources, couverture sociale ;
- produit consommé motivant la démarche de soins ;
- utilisation de la voie intraveineuse, pathologies associées (VIH, hépatites B et C) ;
- origine de la demande (spontanée, proches, milieu scolaire, mesures judiciaires...).

### Remerciements

L'OFDT tient à remercier l'ensemble des CSAPA ayant transmis leurs données dans le cadre du dispositif RECAP.



Observatoire français des drogues et des tendances addictives

69 rue de Varenne 75007 Paris

Tél : 01 41 62 77 16

e-mail : ofdt@ofdt.fr

ISBN : 979-10-92728-65-1

Photo copyrights : ©

www.ofdt.fr