

Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs

Guadeloupe

Édition 2020

Synthèse

La population adulte comme adolescente de Guadeloupe présente des niveaux d'usage de tabac bien en deçà des moyennes métropolitaines. Dans ce contexte d'un moindre tabagisme, la mortalité liée aux cancers des voies pulmonaires s'y révèle plus faible qu'en métropole.

Un profil similaire se dessine concernant l'alcool, malgré une expérimentation plus marquée chez les jeunes Guadeloupéens : les alcoolisations ponctuelles importantes y sont quasiment deux fois moindres tant en population adulte qu'adolescente (respectivement 14 % et 12 % contre 26,2 % et 21,7 % pour la métropole) tout comme les consommations régulières de boissons alcoolisées. En termes de conséquences des usages, la Guadeloupe affiche une mortalité prématurée liée à l'alcool (alcoolisme et cirrhose) légèrement plus faible qu'au niveau national. Si le taux d'interpellation pour ivresses sur la voie publique est nettement inférieur, les accidents corporels ou mortels dus à l'alcool présentent en revanche des taux supérieurs.

Concernant le cannabis, les niveaux d'usages y sont là aussi plus faibles. Pour autant, le nombre d'interpellations pour infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS), concernant principalement le cannabis, y demeure à un niveau supérieur à celui observé ailleurs en France métropolitaine.

Enfin, s'agissant des autres produits illicites, les niveaux d'expérimentation y sont semblables parmi les adolescents alors qu'ils apparaissent quasi inexistantes chez les adultes. Les accidents mortels avec présence de stupéfiants (cannabis compris) y apparaissent en revanche plus fréquents.

Précision : les enquêtes en population générale dans les DROM sont moins fréquentes qu'en métropole compte tenu d'une mise en œuvre souvent plus difficile. Ainsi, s'agissant de la population adulte, les enquêtes du Baromètre de Santé publique France n'y sont pas systématiquement déclinées, la dernière datant de 2014. Par ailleurs, deux indicateurs de conséquences sanitaires (nombre de patients théoriques traités par médicaments de substitution aux opioïde et décès par surdose) s'avèrent également indisponibles pour les DROM.

Usages de produits psychoactifs à l'âge adulte (15-75 ans pour l'alcool et le tabac, 15-64 ans pour les autres produits) en 2014 en Guadeloupe et en France métropolitaine (%)

		Guadeloupe			France métropolitaine		
		H (n=838)	F (n=1188)	Ens. (n=2026)	H (n=7191)	F (n=8444)	Ens. (n=15635)
Alcool	Expérimentation	95	93	94*	96,6	94,1	95,3
	Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)	22*	5*	13*	27,1	9,3	18,0
	Usage quotidien (≥ 30 usages dans le mois)	12*	2*	7*	14,6	4,9	9,7
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Dans le mois (≥ 1 fois)	24	5*	14*	26,2	8,9	17,4
Tabac	Quotidien (≥ 1 cigarette/jour)	20*	11*	15*	32,3	24,2	28,1
	Intensif (≥ 10 cigarettes/jour)	10*	5*	7*	23,0	15,3	19,1
Cannabis	Expérimentation	36*	15*	25*	49,1	33,0	40,9
	Usage dans l'année	13	3*	8*	15,0	7,4	11,1
	Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)	5	<0,5*	3	4,7	1,7	3,2
Poppers	Expérimentation	2*	<0,5*	1*	9,4	4,7	7,0
Cocaïne	Expérimentation	2*	1*	1*	7,9	3,0	5,4
MDMA/ecstasy	Expérimentation	<0,5*	<0,5*	<0,5*	5,9	2,5	4,2
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	1*	<0,5*	1*	6,5	2,7	4,6

Source : Baromètre de Santé publique France 2014

Note : Les prévalences régionales sont arrondies à l'unité près pour des raisons d'effectif.

Note de lecture : 20* signifie que le niveau d'usage quotidien de tabac des hommes du DOM est inférieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues de la France métropolitaine.



Usages de produits psychoactifs à 17 ans en 2017 en Guadeloupe et en France métropolitaine (%)


		Guadeloupe			France métropolitaine		
		H (n=208)	F (n=227)	Ens. (n=435)	H (n=19611)	F (n=19504)	Ens. (n=39115)
Alcool	Expérimentation	94*	88	91*	86,6	84,6	85,7
	Usage dans le mois (≥ 1 usage)	64	54*	59*	69,9	62,9	66,5
	Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)	8	2	5*	12,0	4,6	8,4
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Répétées (≥ 3 fois dans le mois)	16	7	12*	21,7	10,9	16,4
Tabac	Expérimentation	53	47*	50*	58,1	59,9	59,0
	Quotidien (≥ 1 cigarette/jour)	13*	8*	11*	26,3	23,8	25,1
	Intensif (≥ 10 cigarettes/jour)	2*	1	1*	6,5	3,9	5,2
Cannabis	Expérimentation	41	25*	33*	41,8	36,3	39,1
	Usage dans le mois	20	9*	14*	24,2	17,5	21,0
	Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)	10	2	6	9,7	4,5	7,2
Poppers	Expérimentation	3*	1*	2*	9,5	8,0	8,8
Cocaïne	Expérimentation	3	1	2	3,1	2,4	2,8
MDMA/ecstasy	Expérimentation	2	1	2	3,9	2,8	3,4
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	2	1	1*	3,6	1,9	2,8
LSD	Expérimentation	1	1	1	1,9	1,2	1,6
Amphétamines	Expérimentation	1	1	1	2,9	1,8	2,3
Héroïne	Expérimentation	1	1	1	0,7	0,6	0,7
Crack	Expérimentation	1	0	1	0,6	0,6	0,6

Source : ESCAPAD 2017, OFDT

Note : Les prévalences régionales sont arrondies à l'unité près pour des raisons d'effectif.

Note de lecture : 91* signifie que le niveau d'expérimentation de l'alcool dans le DOM est supérieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues de la France métropolitaine.

Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans en Guadeloupe et en France métropolitaine entre 2005 et 2017 (%)



Sources : ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, OFDT



Indicateurs reflétant les conséquences sanitaires des usages de produits psychoactifs

		Guadeloupe	France entière
Décès avant 65 ans par cancers du poumon, des bronches et de la trachée (2016) ¹	Pour 10 000 habitants de 40 à 64 ans	1,7	5,1
Décès avant 65 ans par alcoolisme et cirrhose (2016) ¹	Pour 10 000 habitants de 40 à 64 ans	2,0	2,3
Accidents corporels avec alcool (2017) ²	Pour 100 accidents corporels au taux d'alcoolémie connu	27,8	11,7
Accidents mortels avec alcool (2017) ²	Pour 100 accidents mortels au taux d'alcoolémie connu	46,2	30,2
Accidents mortels avec présence de stupéfiants (2017) ²	Pour 100 accidents mortels avec dépistage stupéfiants réalisé	36,4	22,3

Sources : (1) INSERM-CépiDc, (2) ONISR, (3) GERS-Siamois, (4) Bouchara-Recordati

Autres indicateurs liés aux usages de produits psychoactifs

		Guadeloupe	France entière
Interpellations pour ivresse sur la voie publique (2017) ¹	Pour 10 000 habitants de 15 à 74 ans	5,6	10,9
Infractions à la législation sur les stupéfiants pour ventes et usages/reventes (2018) ²	Pour 10 000 habitants de 15 à 74 ans	51,7	41,2

Sources : (1) DGGN/DGPN/Préfecture de police de Paris, (2) Etat 4001